

**Surface :** 187

**Altitude :**

**Entité paysagère :**


VALOIS MULTIEN.

**Canton(s) concerné(s) :**

BETZ.

**Commune(s) concernée(s) :**

MAREUIL-SUR-OURCQ, MAROLLES.



### Inscription à inventaire, statut de protection :

Site Inscrit Oise 29, ZNIEFF I n° 220013563, ZNIEFF II n° 220013841.

### Valeur patrimoniale

- ☐ Intérêt pour la Faune
- ☐ Intérêt pour la Flore
- ☐ Intérêt pour les Milieux naturels
- ☐ Intérêt pour le Paysage


### Vocation proposée



### Présentation de l'Espace Naturel Sensible (ENS)


Les Bois de Montigny et de Borny s'étendent sur la rive gauche de l'Ourcq, en limite méridionale du plateau du Valois. La vallée du ru d'Allan, orientée ouest-est, sépare les deux bois.





 Délimitation de l'ENS

0 290 580 m





## Description et intérêt de l'Espace Naturel Sensible

### DESCRIPTION ECOLOGIQUE

#### Composition

##### Milieus naturels dominants

la chênaie-charmaie acidocline du *Lonicero periclymeni-Quercetum petraeae* (type subatlantique méridional) ; la chênaie-charmaie à Jacinthe du *Hyacinthoides non-scriptae-Fagetum sylvaticae* (type subatlantique méridional à *Tilia cordata*) ; la chênaie-hêtraie du *Fago sylvaticae-Quercetum petraeae* (type subatlantique méridional) ; la frênaie à Laïche espacée du *Carici remotae-Fraxinetum excelsioris* ; les pelouses calcicoles du *Festuco lemanii-Anthyllidetum vulnerariae*

##### Espèces végétales remarquables

la Scutellaire naine (*Scutellaria minor*), la Danthone décumbente (*Danthonia decumbens*), la Salicaire pourpier (*Lythrum portula*), la Salicaire à feuilles d'Hysopé (*Lythrum hyssopifolia*), l'Oeillet velu (*Dianthus armeria*), l'Aigremoine odorante (*Agrimonia procera*), le Polystic à aiguillons (*Polystichum aculeatum*), l'Ibérisme amer (*Iberis amara*), l'Iris fétide (*Iris foetidissima*)

##### Espèces animales remarquables

le Pic mar (*Dendrocopos medius*), le Pic noir (*Dryocopus martius*), la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) ; la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*), le Tarier pâle (*Saxicola torquata*), le Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*), le Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*), le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) ; le Petit Rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), chiroptère particulièrement menacé dans le nord de l'Europe ; le Grand Murin (*Myotis myotis*) ; le Vespertilion à oreilles échancrées (*Myotis emarginatus*) ; le rare Lézard agile (*Lacerta agilis*) ; la Grenouille agile (*Rana dalmatina*) ; le Triton alpestre (*Triturus alpestris*) ; la Petite Violette (*Clossiana dia*)

### Organisation, fonctionnement et état de conservation

#### Agencement et connexion des milieux dans le site

#### Connexion avec l'extérieur, réseau de milieux similaires

#### Etat de conservation et fragilité du site

### DESCRIPTION PAYSAGERE

### DESCRIPTION SOCIALE



## Usage et gestion de l'Espace Naturel Sensible

*Principaux usages et activités sur le site*

*Principales activités aux alentours*

*Fréquentation*

*Réglementations diverses*

*Foncier*

*Présence de bâtiments*

*Gestion et valorisation actuelles*

*Dégradation et menaces*

## Historique et piste d'actions

*Date d'intégration*

*Pistes d'actions*

*Etat d'avancement*

*Maitre d'ouvrage choisi*